
	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 1	di 8


***: criteri modificati.**

SOSPENSIONI

ABORTO	6 mesi dall'evento
AFFEZIONI gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie	esclusione se affezione attiva, cronica o recidivante
AGOPUNTURA	nessuna (se effettuata con aghi monouso) altrimenti 4 mesi
ALCOOLISMO	definitiva
ALLERGIA - a farmaci - stagionale - vaccini desensibilizzanti	- due mesi dall'episodio - durata - 3 giorni dall'ultima dose
ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE	-da valutarsi con cardiologo AVS
ASBESTOSI	definitiva
ASMA CRONICA (in trattamento)	definitiva
AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni)	definitiva
BPCO	definitiva
BRUCELLOSI	due anni dalla guarigione
BABEBIOSI	definitiva
CARDIOPATIA ISCHEMICA	definitiva
CALO PONDERALE NON MOTIVATO	sospensione in attesa di accertamenti
CITOMEGALOVIRUS	sei mesi dalla guarigione
COMPORTEMENTI SESSUALI - cambio partner (partner stabile) - partner occasionale - partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV - comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue	- quattro mesi da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva
CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE	quattro settimane
*CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE - epatite B - epatite C <i>Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica:</i>	- sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza - sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza - idoneità


	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 2	di 8

CHAGAS	*Soggetti nati (o da madre nata) in zone ad endemia di Chagas possono donare solo previa esecuzione di Ab vs Chagas; in attesa di test: idonei solo per plasmaferesi trascorsi 6 mesi dal rientro
CREUTZFELD-JACOB DISEASE - Trapianto di cornea, somministrazione di ormone della crescita ricavato da ipofisi umana, casi familiari della malattia, farmaci con estratti bovini. - Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996 - Trasfusioni ricevute o interventi chirurgici nel Regno Unito dopo il 1980	-definitiva - definitiva - definitiva - definitiva
DIABETE MELLITO	- sospensione definitiva per diabete I insulino dipendente -idoneità se forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl) - idoneità se in terapia con antidiabetici orali, se in buon compenso glicemico ed esclusi danni d'organo (previa visione da parte del medico AVIS di documentazione del Centro antidiabetico)
DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE - ablazione tartaro ,otturazioni -se presente ferita (es. estrazione, implantologia)	- 2 giorni una settimana dalla guarigione della ferita
DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE) Ad eccezione: DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE PFO	- definitiva - da valutare con consulenza cardiologica AVIS - da valutare con consulenza cardiologica AVIS
DISENDOCRINIE	- definitive se in trattamento ed a patogenesi autoimmune - iper-ipotiroidismi: possibile riammissione dopo un anno dalla sospensione del trattamento se eutiroidismo e non autoimmunità (M. di Basedow: sospensione definitiva) -riscontro di anticorpi antitiroide, TSH normale: idoneità


	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 3	di 8

	*-riscontro di ipotiriodismo con o senza terapia: idoneità
DROGA - leggera (solo h e m) - pesante	- sei mesi dallo stop assunzione - definitiva se per via parenterale o tossicodipendenza -riammissione dopo un anno dallo stop consumo, solo per droghe chimiche o cocaina, se uso sporadico (inteso come <3 volte e non protratto per un tempo determinato)
ECOGRAFIA TRANSLUMINALE	idoneo
EMBOLIA POLMONARE	definitiva (se primitiva o trombofilia)
EMOGLOBINA (livelli di)	- sangue intero : >13.5 M ; >12.5F - plasmaferesi: > 12.5 M ; >11.5 F
ENDOSCOPIA	quattro mesi
ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA)	Idoneità solamente se dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione definitiva
EPATITE A EPATITE B anche pregressa EPATITE C EPATITE da eziologia indeterminata	- 4 mesi dalla guarigione - definitiva - definitiva - definitiva
ESANTEMATICHE (malattie esantematiche)	15 giorni dalla guarigione
EPILESSIA	definitiva- ad eccezione convulsioni febbrili in età pediatrica (1 solo episodio isolato- no terapia a lungo termine)
ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.)	un anno
ETA' - sangue intero (periodici) - sangue intero (accettazione nuovi donatori) - aferesi	- > 18 anni, fino a 65 anni, -fino a 70 solo se esclusi danni d'organo, donazione ogni 6 mesi - > 18 anni, fino a 60 anni - > 18 anni, fino a 60 anni -fino a 67 anni, se esclusi danni d'organo, donazione ogni 3 mesi
FARMACI - antiinfiammatori FANS - antibiotici orali	- 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) - 15 giorni


<ul style="list-style-type: none"> - antibiotici parenterali - antidepressivi - cortisonici - antistaminici - H2 bloccanti / inibitori pompa protonica - ansiolitici / ipnoinduttori - eparina - finasteride - dutasteride - antagonisti recettori alfa - statine - terapia ormonale sostitutiva per menopausa - estrogeni orali - ormoni tiroidei - beta bloccanti - acitretina (Neo Tigason) - altri retinoidi (Roaccutan) - utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) -venoprotettori (es.diosmina) 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 giorni - 30 giorni - 15 giorni - 10 giorni - 5 giorni - 3-7 giorni - 90 giorni - 60 giorni -180 giorni - 5 giorni - 5 giorni - nessuna sospensione - nessuna sospensione - definitiva se pat. autoimmune pluriorgano- -esclusione aspirante; definitiva per donatore periodico che inizia la terapia; nessuna per donatore periodico già in terapia da diversi anni, sospensione se episodi vaso-vagali post donazione. - un anno - 1 mese - definitiva - 5 giorni
FEBBRE > 38 C°	due settimane dopo la cessazione dei sintomi
FEBBRE Q	2 anni dalla guarigione
FILARIOSI	definitiva
FORO ORECCHINO	quattro mesi (idoneità se utilizzati strumenti a perdere)
GASTRORESEZIONE PARZIALE PER ULCERA PEPTICA	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione sangue intero da valutare in base al bilancio del fe - idoneo per plasmaferesi
GLAUCOMA	- nessuna sospensione
GLOMERULONEFRITE ACUTA	cinque anni dalla guarigione
GLOMERULONEFRITE CRONICA	definitiva
HERPES SIMPLEX	- una settimana dalla guarigione
HERPES ZOSTER	- due settimane dalla guarigione
HTLV I/II	definitiva
IMMUNOGLOBULINE	quattro mesi
INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO)	quattro mesi

	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 5	di 8


INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA	definitiva
INFLUENZA	due settimane dalla guarigione
-INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale) <i>ad eccezione taglio cesareo: 6 mesi</i>	-quattro mesi
- INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE	- quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo - un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni)
INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE)	due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.)
IPERTENSIONE ARTERIOSA	- range accettabilità(sangue intero) <ul style="list-style-type: none"> • P.A max: 110/180 • P.A min: 60/100
IPERTENSIONE IN TERAPIA	- v. voce “farmaci”
ISCHEMIA/ EMORRAGIA CEREBRALE - TIA	definitiva
LEBBRA	definitiva
LEISHMANIOSI	definitiva
LYME (malattia di Lyme)	*12 mesi dalla guarigione
MALARIA (malattia)	- idoneità , 6 mesi dopo la guarigione, previa esecuzione di Ab vs malaria, oppure solo plasmaferesi
MALATTIE AUTOIMMUNI	Definitiva se pluriorgano (ad eccezione della celiachia se dieta priva di glutine)

	PROTOCOLLO	
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015 Rev. 11
		Pag. 6 di 8

MALATTIE EMATOLOGICHE - Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) - Coagulopatie sintomatiche - talassemia - trait talassemico - favismo - gammapatia monoclonale (comprese MGUS)	- definitiva - definitiva - definitiva - idoneità solo plasmferesi ,se Hb a livelli adeguati - idoneità per plasmferesi (non ad uso clinico) - definitiva
MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA)	definitiva
MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON...)	definitiva
MALATTIE PSICHIATRICHE - depressione - psicosi	- guarigione - definitiva
MALATTIE VENEREE -LUE -ALTRE	-definitiva -valutazione in base all’anamnesi (vd comportamenti sessuali a rischio)
MESTRUAZIONI	idoneità se non dismenorrea o menorragia
MONONUCLEOSI	sei mesi dalla guarigione
NEOPLASIE MALIGNI -eccezione: carcinoma basocellulare,	- definitiva - un anno dall’asportazione
CIN 3 al Pap-test	-da valutare dopo follow-up (1 anno)
OSTEOMIELITE	due anni dalla guarigione
PARTO	sei mesi
PIERCING	quattro mesi
PESO CORPOREO	superiore a 50 Kg (<i>anche per aferesi!</i>)
PUNTURA DI ZECCA	tre mesi
REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (MALATTIA REUMATICA)	due anni dalla guarigione
RENE POLICISTICO	definitiva
SARCOIDOSI	definitiva
SIFILIDE ACCERTATA ANCHE PREGRESSA	definitiva
SILICOSI	definitiva

	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 7	di 8

STRANIERI (o ITALIANI nati all'estero o con soggiorno prolungato all'estero)	*Idonei se discreta padronanza della lingua italiana , residenza regolare, documenti di identità e codice fiscale -se nati o vissuti per oltre 6 mesi in zone ad endemia malarica: idonei sangue dopo 6 mesi solo se Ab vs malaria negativi
TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE	quattro mesi
TIFO O SALMONELLOSI	un anno
TOSSICODIPENDENZA - (DROGHE PESANTI VIA PARENTERALE) -DA COCAINA(vd definizione td a cap "droga")	definitiva definitiva
TOXOPLASMOSI	sei mesi dalla guarigione clinica
TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI	quattro mesi
TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto di cornea)	-definitiva
*TRAPIANTO DI TESSUTO OSSEO AUTOLOGO OD OMOLOGO	-4 mesi
TRASFUSIONI - INFUSIONE EMODERIVATI (donatori con partner trasfuso)	quattro mesi quattro mesi
TRIPANOSOMIASI	definitiva
TUBERCOLOSI	due anni dalla guarigione
ULCERA PEPTICA	- scomparsa sintomatologia al termine terapia; - se positività HP: un mese dal termine terapia eradicante, in assenza di sintomi
VACCINAZIONI - vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale (Sabin), antivaiole, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica) - vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale –Salk-, antirabbia –profilassi-, antimeningococco, antipneumococco) - Vaccino anti epatite B - vaccino anti rabbia dopo morso di animale	- quattro settimane - 48 ore se apiressia -7 giorni - 7 giorni
VIAGGI EXTRA-EUROPA	*VEDI ELENCO PAESI A RISCHIO
VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE:	Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Sospensione di 28

	PROTOCOLLO		
	Criteria Sospensioni <i>(documento a scopo di consultazione per donatori)</i>	Data: 28.12.2015	Rev. 11
		Pag. 8	di 8

	giorni dalla guarigione. *Se malattia: 4 mesi di sospensione
XENOTRAPIANTO	definitiva